

**【重要なお願い】**新型コロナウイルス感染症対応のため、検査に休止や変更が生じている可能性があります。最新の情報は、仙台市ホームページよりご確認くださいか、直接お問合せをお願いいたします。



～匿名・無料～

# 仙台市 HIV (エイズ) 検査・梅毒検査・クラミジア検査

令和2年4月改訂

～HIV 検査・梅毒検査・クラミジア検査は下記の検査会場で匿名・無料で実施しています～

検査会場	検査日	受付時間	HIV	梅毒	クラミジア	予約	問合せ・相談先
●(4-6月) 健康相談所 興生館 ●(それ以外) AER(アエル)6F	第2・4金曜日 【夜間】	17:00 ～19:00	○ (即日検査)	○ (即日検査)	×	要予約	<予約方法> ●仙台市ホームページから電子申請 ●予約専用電話 090-4478-4641 (平日 13時～16時)  <予約受付期間> 検査の1か月前～検査前日まで  <問合せ・相談> 022-214-8029 (健康安全課)
青葉区役所 2F	第3土曜日 【休日】 (6・12月を除く)	13:30 ～15:00					
青葉区役所 2F	第1木曜日 【夜間】	17:30 ～19:00	○ (通常検査)	○ (通常検査)	○ (通常検査)		
青葉区役所 2F	毎週金曜日	9:00 ～11:00	○ (通常検査)	○ (通常検査)	×	予約不要	022-225-7211 (管理課 内線 6715)
宮城野区役所 3F	第1・3木曜日	9:00 ～10:30					022-291-2111 (管理課 内線 6717)
若林区役所 3F	第2・4水曜日	9:00 ～10:30					022-282-1111 (管理課 内線 6715)
太白区役所 3F	第2・4火曜日	13:30 ～15:00					022-247-1111 (管理課 内線 6717)
泉区役所 東庁舎 2F	第1・3月曜日	9:00 ～10:30					022-372-3111 (管理課 内線 6716)

## <結果通知>

・ご本人に面接でお知らせしますので、必ずご本人が結果を聞きに来てください。

**即日検査** 採血の約1時間後にお伝えします。(判定保留の場合は後日再来所いただき、お伝えします)

**通常検査** 1週間後(泉区役所の検査は翌週火曜)に再来所いただき、お伝えします。

(検査後に祝日がある場合、1週間後にお知らせできないことがあります)

・氏名入り HIV 検査成績書は有料です。必要な方は、事前にお問合せの上、身分証明書と手数料(1,200円)をご持参ください。仙台市の所定の様式(日本語または英語)でお出しいたします。(夜間検査・即日検査では発行できません)

## <検査方法>

**HIV(エイズ)検査** 血液検査

**梅毒検査** 血液検査(HIV検査と同時に採血)

※過去に梅毒の治療歴がある場合は梅毒即日検査では陽性と判定されます。各区役所平日の梅毒通常検査をお受けください。

**性器クラミジア検査**

男性：尿検査(最後の排尿から1時間以上経過した尿)

女性：子宮頸部の分泌物をご自分で採取していただく検査(自己採取)

生理中、妊娠中の方は検査できません。

詳しい検査日程や検査会場へのアクセスは、  
仙台市ホームページをご確認ください。

こちらのQRコードから、またはネットで検索!



ネットでけんさく

エイズ検査 仙台市 または 仙台 HIV ネット 🔍 検索

エイズ・性感染症検査は各区保健福祉センター等で  
通年で実施中!

# HIV/エイズ・ 性感染症の知識

## 感染を予防する アドバイス

これだけは守りましょう

HIVに感染する主な経路はつぎの3つです。自分のためにもパートナーのためにも、感染予防のために必ず以下の★を実行してください。

### 1 性行為

(精液・膣分泌液)

感染者との無防備な性行為は感染の可能性が高い。

★ 性交・オーラルセックス(口腔性交)の際は、必ずコンドームを使う

★ 性器具の共用をしない

### 2 血液を介して

血液にふれることや、血液が体内に入ると感染の可能性が高まる。

★ 注射器具の共用をしない



### 3 母親から赤ちゃんへ(母子感染)

感染している母親から妊娠中・出産時・授乳などによって子どもに感染することがある。

★ 予防措置(服薬、帝王切開、人工栄養(粉ミルク)での養育)を行う

もっと  
知ってください  
性感染症  
(STI)のこと!

STI(Sexually Transmitted Infection)は性行為で感染する病気です。若者を中心に感染者が増加しています。STIに感染しているとHIVに感染しやすくなります。また、ほうっておくと女性の場合、不妊症や子宮外妊娠をおこすことがあります。妊娠・出産時に母子感染の可能性も出てきます。STIのほとんどはコンドームで予防できます。感染したら放置せず、パートナーといっしょに治療を受けましょう。

病名	特徴	症状	
		男性	女性
梅毒 <i>HIV感染との重複が一番多い!</i>	皮膚や粘膜の小さな傷から細菌が侵入して感染し、やがて全身に広がり、さまざまな症状をひきおこす。	感染後約3週間で、感染部位に大豆くらいの赤くてかたい痛みのないしこりができる。	
性器クラミジア感染症 <i>最も感染者が多い!</i>	男女とも感染者が多い。	尿道に軽い炎症をおこし、排尿時にしみる。尿道から薄い分泌物が少し出る。	不正子宮出血や軽い下腹部痛、性交痛。
淋菌感染症(淋病) <i>男女に拡大</i>	最近とくに男性のあいだで感染が広がっている。	尿道炎になり、強い排尿痛、尿道口に発赤。尿道から濃い黄白色の分泌物が多量に出る。	おりものの増加、排尿痛、頻尿。
尖圭コンジローマ	湿った部分にいぼがびっしりできる。子宮頸がん、外陰がんをひきおこす可能性もある。	性器・肛門周囲に淡紅色や薄い茶色のいぼができ、カリフラワ-状になる。	
性器ヘルペス感染症	女性に多く、感染するとウイルスが潜伏し、皮疹を繰り返す。	陰茎包皮や亀頭などに複数の小さな水疱が出る。数日後に破れ、痛みをともなう浅い潰瘍となる。	外陰部に複数の水疱ができ、破れて潰瘍となる。強い痛みによる排尿困難や発熱をともなう。
トリコモナス症	トリコモナス原虫が病原体。女性に多くみられる。		膣炎や外陰炎をおこし、悪臭をともなうおりものやかゆみがある。
B型肝炎 <i>HIV感染との重複が多い!</i>	感染経路として血液を介することが多いが、性行為によっても感染する。	全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がでることがある。無症状の場合も多い。	

(公財)エイズ予防財団「HIVエイズの基礎知識」より抜粋

～HIV・性感染症に関する相談は、各区役所保健福祉センター管理課及び下記でも対応しています～

民間ボランティアによるエイズ相談(東北HIVコミュニケーションズ) 第2・4土曜日/18:00～21:00 TEL022-766-8699