



— 匿名・無料 —

参考資料

仙台市 HIV (エイズ)・性感染症 検査

令和4年4月改訂

検査の実施状況 ご確認のお願い(重要)

新型コロナウイルス感染症の影響により、検査の実施状況に変更が生じております。

最新の情報は仙台市ホームページよりご確認ください。下記お問合せ先にお尋ねください。

○最新の検査の情報は、こちらからご確認ください



詳しくはWebで

○お問合せ先

青葉区役所 管理課 (代表) 022-225-7211
宮城野区役所 管理課 (代表) 022-291-2111
若林区役所 管理課 (代表) 022-282-1111
太白区役所 管理課 (代表) 022-247-1111
泉区役所 管理課 (代表) 022-372-3111
感染症対策室 (代表) 022-214-8029

検査会場・日時 一覧 (2022年4月現在)

※変更が生じている可能性がありますので必ず最新情報のご確認をお願いいたします。

| 検査会場 | 検査日 | 受付時間 | HIV | 梅毒 | クラミジア | 予約 | 予約方法 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| ●(2022.4-6月) 健康相談所 興生館 ●(7月-2023.3月) AER(アエル)6F | 第2・4 金曜日 【夜間】 | 17:00 ~ 19:00 | ○ (即日 検査) | ○ (即日 検査) | × | 要 予 約 | ●仙台市ホームページから 電子申請(24時間受付) または ●予約専用電話 090-4478-4641 (平日13時~16時) <予約受付期間> 検査の1か月前~検査前日 まで (先着順で定員に到達しだい 受付終了) |
| 健康相談所 興生館 | 第1土曜日 【休日】 | 13:30 ~ 15:00 | | | | | |
| 青葉区役所 2F | 第1木曜日 【夜間】 | 17:30 ~ 19:00 | ○ (通常 検査) | ○ (通常 検査) | ○ (通常 検査) | | |

【注意事項】

- ・検査を受けるには事前予約が必要です。
- ・「通常検査」は、結果説明のために後日(概ね1週間後)ご本人に再来所いただきます。
- ・いずれの会場も HIV と梅毒は同時検査であり、どちらか一方のみの検査はできません。
- ・過去に梅毒の治療歴がある場合は、一般的に梅毒即日検査では陽性と判定されます。
- ・クラミジア検査は性器クラミジアの検査です。生理中、妊娠中の方は検査できません。

HIV/エイズ・ 性感染症の知識

感染を予防する アドバイス

これだけは守りましょう

HIVに感染する主な経路はつぎの3つです。自分のためにもパートナーのためにも、感染予防のために必ず以下の★を実行してください。

1 性行為

(精液・膣分泌液)

感染者との無防備な性行為は感染の可能性が高い。

★性交・オーラルセックス(口腔性交)の際は、必ずコンドームを使う

★性器具の共用をしない

2 血液を介して

血液にふれることや、血液が体内に入ると感染の可能性が高まる。

★注射器具の共用をしない



3 母親から赤ちゃんへ(母子感染)

感染している母親から妊娠中・出産時・授乳などによって子どもに感染することがある。

★予防措置(服薬、帝王切開、人工栄養(粉ミルク)での養育)を行う

もっと
知ってください
性感染症
(STI)のこと!

STI(Sexually Transmitted Infection)は性行為で感染する病気です。若者を中心に感染者が増加しています。STIに感染しているとHIVに感染しやすくなります。また、ほうっておくと女性の場合、不妊症や子宮外妊娠をおこすことがあり、妊娠・出産時に母子感染の可能性も出てきます。STIのほとんどはコンドームで予防できます。感染したら放置せず、パートナーといっしょに治療を受けましょう。

| 病名 | 特徴 | 症状 | |
|-------------------------|---|--|---|
| | | 男性 | 女性 |
| 梅毒 HIV感染との重複が一番多い! | 皮膚や粘膜の小さな傷から細菌が侵入して感染し、やがて全身に広がり、さまざまな症状をひきおこす。 | 感染後約3週間で、感染部位に大豆くらいの赤くてかたい痛みのないしこりができる。 | |
| 性器クラミジア感染症 最も感染者が多い! | 男女とも感染者が多い。 | 尿道に軽い炎症をおこし、排尿時にしみる。尿道から薄い分泌液が少し出る。 | 不正子宮出血や軽い下腹部痛、性交痛。 |
| 淋菌感染症(淋病) 男女に拡大 | 最近とくに男性のあいだで感染が広がっている。 | 尿道炎になり、強い排尿痛、尿道口に発赤。尿道から濃い黄白色の分泌物が多量に出る。 | おりものの増加、排尿痛、頻尿。 |
| 尖圭コンジローマ | 湿った部分にいぼがびっしりできる。子宮頸がん、外陰がんをひきおこす可能性もある。 | 性器・肛門周囲に淡紅色や薄い茶色のいぼができ、カリフラワー状になる。 | |
| 性器ヘルペス感染症 | 女性に多く、感染するとウイルスが潜伏し、皮疹を繰り返す。 | 陰茎包皮や亀頭などに複数の小さな水疱が出る。数日後に破れ、痛みをとともう浅い潰瘍となる。 | 外陰部に複数の水疱ができ、破れて潰瘍となる。強い痛みによる排尿困難や発熱をとともなう。 |
| トリコモナス症 | トリコモナス原虫が病原体。女性に多くみられる。 | | 膣炎や外陰炎をおこし、悪臭をとともなうおりものやかゆみがある。 |
| B型肝炎 HIV感染との重複が多い! | 感染経路として血液を介することが多いが、性行為によっても感染する。 | 全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がでることがある。無症状の場合も多い。 | |

(公財)エイズ予防財団「HIVエイズの基礎知識」より抜粋

～HIV・性感染症に関する相談は、各区役所管理課で受け付けております～